



予防接種を受けましょう!

町で実施している予防接種

個別接種(指定医療機関)	集団接種(保健センター)
三種混合1期 (生後6か月～90か月未満児)	ツベルクリン反応検査・BCG (生後3か月～4歳未満児)
三種混合1期追加 (1期初回3回終了後12か月後)	
麻しん(生後12か月～90か月未満児)	ポリオ(生後3か月～90か月未満児)
風しん(生後12か月～90か月未満児)	二種混合(小学6年生)
麻しん接種後でないとうけられませんが	
日本脳炎1期 (生後36か月～90か月未満児)	
日本脳炎1期追加 (1期初回2回終了後12か月後)	
日本脳炎2期(小学4年生)	
日本脳炎3期(中学3年生)	
インフルエンザ(65歳以上)	

予防接種は、健康な人が元気な時に接種を受け、その病原菌の感染を予防するものです。対象年齢になりましたら、お子さんの体調をみながら早めに受けましょう。

日ごろから保護者の皆さんは、お子さんの体質・体調など健康状態によく気を配ってください。そして何か気になることがあれば、あらかじめかかりつけの医師に相談しておきましょう。

予防接種前の

注意事項

個別予防接種を受ける場合は、事前に個別接種実施医療機関(予防接種手帳と一緒に配付)の表を参考に電話等で予約をとってください。

予防接種は、接種を受けるお子さんの日ごろの健康状態をよく知っている方が、必ず付き添ってください。同居家族以外の方が連れてくる場合は、委任状が必要になります。

接種間隔は必ず守ってください



(委任状は、予防接種手帳の中に綴じ込んであります。)

予防接種についての個人通知はしていません。各家庭に配られている保健事業予定表・めいわカレンダー等を参考にしてください。

予防接種を受ける前には、必ず「予防接種と子どもの健康」の小冊子をご一読ください。

予診票は、保護者が責任をもって記入してください。

当日は、母子手帳を忘れず
に持参してください。

予防接種を

受けることができない方

- 明らかに発熱のある方
- 一般的に、熱のある方は、接種会場で測定した体温が37.5 を超える場合をさします。
- 重篤な急性疾患に罹っていることが明らかの方。
- その日に受ける予防接種によって、又は予防接種に含まれる成分でひどいアレルギー症状を起こしたことのある方。

- その他、医師が不相当と判断した場合。

予防接種を

受けた後の注意事項

予防接種後30分は、お子さんの様子をよく観察してください。急な副反応はこの間に起こることがあります。

接種後生ワクチンでは、2～3週間後、不活化ワクチンでは24時間は、副反応の出現に注意してください。

入浴は差し支えありませんが、注射部位をこするのはやめてください。

接種当日は、激しい運動は控え静かに過ごしてください。