

# 予防接種

予防接種を受けることが  
できないかた

- 明らかに発熱のあるかた  
(体温が37.5 以上)

- 重篤な急性疾患にかかっていることが明らかなかた、急性の病気で薬を飲む必要のあるかたは、その日は見合わせます。

- インフルエンザワクチンに含まれる成分により、アナフィラキシーを起こしたことが明らかなかたです。

アナフィラキシー……接種後30分以内に起こるひどいアレルギー反応。発汗、全身にひどい蕁麻疹が出る、吐き気、嘔吐、息が苦しいなどの症状に続き、血圧が下がっていく激しい全身反応。

担当医師とよく相談しな  
くてはならないかた

- 心臓病、腎臓病、肝臓病や血液、その他慢性疾患で治療を受けているかた

- インフルエンザ予防接種後、2日以内に発熱、発疹、蕁麻疹等のアレルギーを思わす異常が見られたかた

- けいれんをおこしたことがあるかた

- 中耳炎や肺炎などによくかかり、免疫状態を検査して異常を指摘されたかた

- インフルエンザ予防接種成

分または、鶏卵、鶏肉などに対してアレルギーがあるといわれたかた  
詳しくは保健福祉課へお問い合わせください。

## 乳幼児ツベルクリン反応 検査・判定・BCGの お知らせ

乳幼児の結核は、大人に比べると重症化しやすく、生命にもかかります。BCGは乳幼児の重症の結核(結核性髄膜炎)に対して、最も予防効果が期待できます。

結核予防法では「初回BCGは4歳に達するまでに接種」すればよいことになっていますが、重症の結核を防ぐためには、生後3か月から6か月に接種するのが理想です。

対象

乳幼児  
(平成16年1月1日から6月30日までの生まれおよび4歳未満の未済児)

期日

ツベルクリン反応検査

10月13日(水)  
判定・BCG

10月15日(金)



検査予備日

ツベルクリン反応検査

10月26日(火)

判定・BCG

10月28日(木)

受付時間

午後1時10分～2時

会場

保健センター

持参するもの

予診票・母子手帳

ツベルクリン反応検査……

反応検査を行って48時間後に判定します。ツベルクリン反応検査および判定を受けなければBCGは受けられません。

BCG……結核の免疫をつけるために接種します。重症の結核の約80%を予防します。

## 高血圧教室の 開催

高血圧は、動脈硬化をすすめ、脳卒中や心筋梗塞等の重大な合併症につながる恐れがあります。この機会に正しい知識を身につけて、上手にコントロールをしていきましょう。

無料  
申し込み  
9月22日(水)までに保健福祉課へ

### 高血圧教室プログラム(2日コース)

日 時	内 容	場 所
9/27(月) 13:30~	講話「血圧の常識再点検...知って得する血圧の豆知識」 個別相談(希望者)	保健センター
10/19(火) 10:00~	講話および調理実習「手軽にできるおいしい減塩料理」...男性のかたにも作れる簡単レシピです 米1合・エプロン・三角巾持参	中央公民館